




P CAIN CREAM

S CAIN CREAM

Крем анестетик для наружного применения



P CAIN CREAM

S CAIN CREAM

- Безрецептурный препарат
- Производится в соответствии с правилами производства лекарственных средств (GMP)



- Крем-анастетик для местного применения CAIN CREAM сохранит область применения нечувствительной на время проведения процедуры.
- Лидокаин, входящий в состав крема, широко применяется в медицине.
- CAIN CREAM соответствует всем стандартам индустрии и даёт эффективный результат, что было доказано многими докторами по всему миру.

	P CAIN CREAM	S CAIN CREAM
УПАКОВКА	500Г/банка	500Г/банка, 30Г/тюбик
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА	(25мг ЛИДОКАИН + 25мг ПРИЛОКАИН)/г	105.6мг ЛИДОКАИН/г
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВЕЩЕСТВО	МЕТИЛПАРАОКСИБЕНЗОАТ 1.0мг/г	МЕТИЛПАРАОКСИБЕНЗОАТ 1.0мг/г
СОСТАВ	ГЛИЦЕРИНА МОНОСТЕАРАТ	СТЕАРИЛОВЫЙ СПИРТ
	Н-МЕТИЛПИРРОЛИДОН	ИЗОПРОПИЛМИРИСТРАТ
	ЖИДКИЙ ПАРАФИН	КАРБОМЕР 940
	ИЗОПРОПИЛМИРИСТРАТ	ТРОЛАМИН
	ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА	ПОЛИСОРБАТ 60
	КАРБОМЕР 940	ЭТАНОЛ
СРОК ГОДНОСТИ	36 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	36 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ХРАНЕНИЕ	КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ФОРМА ВЫПУСКА	КРЕМ БЕЛОГО ЦВЕТА	КРЕМ БЕЛОГО ЦВЕТА

P CAIN CREAM

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА

Поверхностная анестезия кожи во время проведения косметических или хирургических инъекционных процедур.
Анестезия слизистой оболочки половых органов (например, перед удалением кондилом).
Поверхностная анестезия трофических язв нижних конечностей перед местной хирургической операцией (например, перед удалением фибрина, гноя или подкожной клетчатки).

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЦЕДУРЕ

1. Кожа

После нанесения крема на нужный участок кожи - накройте его плёнкой для обеспечения анестезирующего эффекта. Плёнку рекомендуется выдерживать на протяжении 1-3 часов; после снятия плёнки анестезирующий эффект сохраняется в течение часа.

2. Слизистая оболочка половых органов

При удалении кондиломы нанесите 10г препарата на обработанный участок кожи на 5-10 минут, затем полностью удалите крем и приступайте к процедуре.

3. Трофические язвы

После нанесения крема на нужный участок кожи - накройте его плёнкой для обеспечения анестезирующего эффекта. Препарат необходимо наносить следующим образом: 1-2 г крема на квадрат 10 см, не превышая 10 г на каждую процедуру. Время выдержки под плёнкой - минимум 30 минут. При язвах на ногах, трудно поддающихся обработке, время выдержки анестетика можно продлить до 60 минут. После удаления крема следует тщательно промыть зону язв в течение 10 минут. При применении до 15 раз в течение 1-2 месяцев снижение эффективности препарата не наблюдалось.

S CAIN CREAM


ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА

Поверхностная анестезия кожи во время проведения косметических процедур.
Анестезия слизистой оболочки мужских половых органов.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЦЕДУРЕ

Нанесите 0,25–0,66 г крема-анестетика (23–62 мг лидокаина) на кожу за 5–15 минут до проведения процедуры. Не используйте больше 2 г крема (184 мг лидокаина) в течение 24 часов.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



1. Очистите и высушите участок кожи, на который будет нанесён анестетик

2. Равномерно нанесите на кожу крем-анестетик



3. Накройте участок плёнкой, выдержите рекомендованное время до полного онемения

4. Уберите остатки крема салфеткой или мягкой тканью

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не наносите крем-анестетик на область кожи вокруг глаз, так как это может вызвать раздражение роговицы. При попадании крема в глаза следует обильно промыть их чистой водой или раствором хлорида натрия.
2. Как и другие местные анестетики, крем не следует наносить на поврежденную барабанную перепонку или в других случаях возможного проникновения крема в среднее ухо.
3. Не следует наносить крем на открытые раны.



#522 Dongkwang BizTower, 272 Sunhwagung-ro,
Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
+82-2-6225-7988

Website: www.sbodyline.com

Email: dfkbio@dfkbio.com