

ANESTESIA LOCAL EN CREMA



CREMA P CAIN
CREMA S CAIN

CREMA P CAIN

CREMA S CAIN



Clasificada como medicamento de venta libre

Aprobada por las buenas prácticas de fabricación (GMP)

	CREMA P CAIN	CREMA S CAIN
ENVASE	POTE DE 500 G	POTE DE 500 G
COMPOSICIÓN	(25 mg de LIDOCAÍNA + 25 mg de PRILOCAÍNA)/g	105,6 mg de LIDOCAÍNA/g
CONSERVANTES	METIL PARAOXIBENZOATO 1,0 mg/g	METIL p-HIDROXIBENZOATO 1,0 mg/g
OTROS ADITIVOS	MONOESTEARATO DE GLICERINA	ALCOHOL ESTEARÍLICO
	N-METILPIRROLIDONA	MIRISTATO ISOPROPÍLICO
	PARAFINA LÍQUIDA	CARBÓMERO 940
	MIRISTATO ISOPROPÍLICO	TROLAMINA
	AGUA PURIFICADA	POLYSORBATE60
	CARBÓMERO 940	ETANOL
VALIDEZ	36 MESES DESDE LA FECHA DE FABRICACIÓN	36 MESES DESDE LA FECHA DE FABRICACIÓN
ALMACENAMIENTO	TEMPERATURA AMBIENTE	TEMPERATURA AMBIENTE
ASPECTO	CREMA BLANCA	CREMA BLANCA

CREMA P CAIN

EFFECTOS Anestesia superficial de la piel para procedimientos quirúrgicos o inserción de agujas
Anestesia para la mucosa genital (p. ej., antes de la extracción de condilomas)
 Anestesia superficial para úlceras en las piernas antes de irrigación o cirugía topical
 (p. ej., extracción de fibrina, pus o tejido subcutáneo)

POSOLOGÍA 1. Piel
 Después de aplicar este fármaco, cubrir la zona con cinta. Mantener la zona de la aplicación tapada de 1 a 3 horas. El efecto puede durar más de 1 hora, una vez retirada la cinta.

2. Mucosa genital
 Para la extracción de condilomas, aplique 10 g de este fármaco en la zona tratada de 5 a 10 minutos, limpie y comience el procedimiento de inmediato.

3. Úlcera en la pierna
 Después de aplicar este fármaco, cubrir la zona con cinta. Aplique de 1 a 2 g por cada 10 cm² durante un mínimo de 30 minutos. No debe exceder los 10 g por tratamiento. Para las úlceras en la pierna que afectan tejidos de difícil alcance, el tiempo de aplicación puede extenderse a 60 minutos. Limpie las úlceras dentro de los 10 minutos después de haber limpiado la crema. En los casos en que se usó hasta 15 veces en un período de uno a dos meses, no se observó disminución del efecto ni aumento de la reacción local.

CREMA S CAIN

EFFECTOS Anestesia local para procedimientos cosméticos
Reducción de la sensibilidad en el órgano sexual masculino

POSOLOGÍA En adultos, aplicar de 0,25 g a 0,66 g (de 23 mg a 62 mg de lidocaína) en la zona de aplicación de 5 a 15 minutos antes del procedimiento. No supere los 2 g (184 mg de lidocaína) en 24 horas.

MODO DE USO



1. Antes de aplicar el producto, lave y seque bien la zona.

2. La crema Cain debe aplicarse de forma directa sobre la piel, en una capa homogénea y bien distribuida en la zona afectada.



3. Cubrir con plástico y dejar reposar de 30 a 60 minutos hasta que se adormezca por completo.

4. Absorber con un papel tisú o un paño suave antes de aplicar el producto.

- PRECAUCIONES**
1. No aplique la crema Cain en el contorno de ojos porque puede irritar la córnea. Si la crema Cain entra en contacto con los ojos, debe lavarlos de inmediato con agua o una solución salina y cubrirlos hasta que recupere la sensibilidad.
 2. Como sucede con otras anestésicas de uso local, este fármaco puede ser toxigénico para el oído, por lo que no debe aplicarse en el oído medio, ni debe usarse en procedimientos o paracentesis que puedan penetrar en el oído medio.
 3. No aplicar en lesiones erosivas abiertas.



CREMA P CAIN CREMA S CAIN

#522, 272 Sunhwagung-ro, Namyangju-si,
Gyeonggi-do, República de Corea
+82-2-6225-7988
www.sbodyline.com
dfkbiolab@sbodyline.com