

# iREJU LIPO BODY

DFK  
BIO  
LAB+

ЭФФЕКТИВНАЯ  
НОВАЯ  
ФОРМУЛА  
ДЛЯ  
S-ЛИНИИ



# ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

## Эффективный липолиз

Фосфатидилхолин (PPC), 1000 мг  
Дезоксихолат натрия, чистота 99%

## Ускоритель липолиза

L-карнитин, витамины B2, B3, B12

## Антиоксидант для кожи

Витамины C, B2, B3  
Никотиноил трипептид-1  
Аденозин

## Регенерация коллагена и эластина (факторы роста)

EGF, FGF, IGF (PPM 1,000), SOD, TRX

## Повышение эластичности и уменьшение морщин

Ацетил гексапептид-8  
Пальмитоил пентапептид-4  
Пальмитоил тетрапептид-7  
Дипептид d1

## Успокаивающее и антибактериальное действие

Naturcide Plus, MultiEx BSASM Plus  
Аденозин, аргинин, арбутин




## Эффективный ускоритель липолиза

Фосфатидилхолин (PPC), 1000 мг  
Дезоксихолат натрия, чистота 99%

Дезоксихолат натрия разрушает мембраны жировых клеток, в то время как фосфатидилхолин (PPC) проникает в них и способствует растворению высвобожденного жирового содержимого. L-карнитин вместе с витаминами B2, B3 и B12 дополнительно ускоряет жировой обмен.

L-карнитин усиливает расщепление жира и поддерживает выведение растворённого жира из организма.


Витамины B2, B3 и B12 активируют энергетические пути, участвующие в метаболизме жиров, способствуя снижению локальных жировых отложений.



Скопление жировых клеток




Проникновение в жировой слой



Процесс растворения жировых клеток



Ускоренное разрушение жировых клеток



Естественное выведение атрофированных жировых клеток

# ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



## Устранение морщин во время липолиза


Дипептид диаминобутирил бензиламид (Syn-AKE)

Ацетил гексапептид-8, никотиноил трипептид-1, пальмитоил пентапептид-4, пальмитоил тетрапептид-7

Дипептид диаминобутирил бензиламид и ацетил гексапептид-8 - это пептидные ингредиенты, полученные из растительных аминокислот. Они эффективно уменьшают выраженность морщин и улучшают упругость кожи.

Эти пептиды помогают минимизировать уже существующие морщины и подавляют образование новых в процессе липолиза.

Они не вызывают раздражения и не токсичны, обеспечивают быстрое впитывание и минимальный риск побочных эффектов.




## Регенерация коллагена и эластина в процессе липолиза

EGF, FGF, IGF (1,000PPM), SOD, TRX

Пальмитоил пентапептид-4, пальмитоил тетрапептид-7

EGF (эпидермальный фактор роста), FGF (фактор роста фибробластов) и IGF (инсулиноподобный фактор роста) ускоряют выработку клеток, синтезирующих коллаген и эластин в коже. Они также стимулируют образование новых структурных компонентов, таких как коллаген, эластин и гиалуроновая кислота. В результате они способствуют уменьшению морщин и повышению эластичности кожи, формируя более здоровую кожную среду.

Ускоренное обновление клеток помогает очищать кожу от накопленных загрязнений, придавая ей более выраженный эффект осветления и улучшая общий тон и текстуру кожи.



# ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Представленная информация носит рекомендательный характер. Возможны отклонения в зависимости от анатомических особенностей или состояния пациента.



## Верхняя часть руки

Коррекция в районе верхней части руки (0.01-0.05мл или меньше)

## Линия брa на спине

Коррекция зоны линии брa (0.05-0.1мл или меньше)

## Талия, бока

Коррекция в районе талии (0.05-0.2мл или меньше)

## Живот

Коррекция области живота (0.05-0.2мл или меньше)

## Бедра

Коррекция линии под ягодичной складкой (0.05-0.15мл или меньше)

# СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Встряхните флакон, чтобы равномерно смешать осадок на дне.
2. Нанесите рекомендованное количество препарата на выбранную зону. Объем может корректироваться в зависимости от состояния пациента.
3. Для достижения наилучших результатов повторите процедуру 2-3 раза с интервалом 15 дней.

## Меры предосторожности:

1. Не использовать у пациентов с аллергией на сою.
2. После процедуры не рекомендуется заниматься физическими нагрузками, посещать сауну, употреблять алкоголь и жирную пищу.
3. Не использовать у пациентов с атопическим дерматитом, дерматитами, заболеваниями сердца, диабетом, онкологическими заболеваниями, после инсульта или при атеросклерозе. Не применять при индивидуальной аллергической реакции на любой из компонентов препарата.
4. Использовать препарат сразу после вскрытия. Повторное использование запрещено.



#522 Dongkwang BizTower, 272 Sunhwagung-ro,  
Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  
+82-2-6225-7988

Website: [www.sbodyline.com](http://www.sbodyline.com)

Email: [dfkbio@dfkbio.com](mailto:dfkbio@dfkbio.com)