

CREME ANESTÉSICO LOCAL



P CAIN CREAM
S CAIN CREAM

P CAIN CREAM

S CAIN CREAM

- Classificado como medicamento OTC (Sem prescrição médica)
- Aprovado pela GMP



- Como um creme anestésico local, o CAIN CREAM proporcionará a dormência da área tratada durante o período do procedimento.
- O principal ingrediente é a lidocaína, que é amplamente utilizada para fins médicos.
- O CAIN CREAM atende a todos os padrões do setor e proporciona resultados

	P CAIN CREAM	S CAIN CREAM
EMBALAGEM	500G/POTE	500G/POTE, 30g/TUBO
COMPOSIÇÃO	(25 mg de LIDOCAÍNA + 25 mg de PRILOCAÍNA)/g	105,6 mg de LIDOCAÍNA/g
PRESERVAÇÃO	PARA-OXIBENZOATO DE METILA 1,0mg/g	p-HIDROXIBENZOATO DE METILA 1,0mg/g
OUTROS ADITIVOS	MONOESTEARATO DE GLICERINA	ÁLCOOL ESTEARÍLICO
	N-METILPIRROLIDONA	MIRISTATO DE ISOPROPILA
	PARAFINA LÍQUIDA	CARBÔMERO 940
	MIRISTATO DE ISOPROPILA	TROLAMINA
	ÁGUA PURIFICADA	POLISSORBATO 60
	CARBÔMERO 940	ETANOL
VIDA ÚTIL	36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO	36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO
ARMAZENAMENTO	TEMPERATURA AMBIENTE	TEMPERATURA AMBIENTE
APARÊNCIA	CREME BRANCO	CREME BRANCO

P CAIN CREAM

EFEITOS

Anestesia superficial da pele durante a inserção de agulhas ou procedimentos cirúrgicos

Anestesia da mucosa genital (por exemplo, antes da remoção de condiloma)

Anestesia superficial de úlceras de perna antes da irrigação ou cirurgia tópica (por



DOSAGEM

1. Pele

Depois de aplicar esse medicamento, cubra-o com fita de vedação. Normalmente, a vedação no local da aplicação deve ser mantida por 1 - 3 horas e o efeito dura, pelo menos, 1 hora após a remoção da fita de vedação

2. Mucosa genital

Ao remover o condiloma, aplique 10g desse medicamento na área tratada por 5 - 10 minutos. Depois remova o medicamento e inicie o procedimento imediatamente

3. Úlcera de perna

Depois de aplicar esse medicamento, cubra-o com fita de vedação. Aplique 1-2g/10cm quadrados por, pelo menos, 30 minutos e não exceda 10g para cada tratamento. Para úlceras de perna de tecidos difíceis de tratar, o tempo de aplicação pode ser estendido para 60 minutos, e as úlceras devem ser lavadas em até 10 minutos após a remoção do creme. Quando usado até 15 vezes em 1 - 2 meses, não houve diminuição do efeito nem aumento da reação local.

S CAIN CREAM

EFEITOS

Anestesia local durante procedimentos cosméticos

Redução da sensibilidade do órgão sexual masculino

DOSAGEM

Aplique 0,25-0,66 g (23-62 mg como lidocaína) no ponto da aplicação 5 a 15 minutos antes do procedimento para adultos. Não exceda 2g (184mg como lidocaína) em 24 horas.

COMO USAR



1. Antes da aplicação, lave e seque bem a área.
2. O CAIN CREAM deve ser aplicado diretamente na pele, espalhado uniformemente sobre a área afetada.



3. Cubra com filme plástico e deixe agir pelo tempo recomendado até a dormência completa.
4. Enxugue com um lenço de papel ou um pano macio antes de aplicar o produto.

- CUIDADOS**
1. Não aplique o produto ao redor dos olhos, pois ele pode causar danos à córnea. Se o produto entrar em contato com os olhos, eles devem ser lavados com água ou solução de cloreto de sódio e devem ser protegidos até que a dormência volte.
 2. Como outros anestésicos locais, ele pode ser tóxico para os ouvidos e não deve ser aplicado no ouvido médio. Este produto não deve ser usado em procedimentos que exijam a penetração do ouvido médio
 3. Não aplique em erosões abertas.



P CAIN CREAM S CAIN CREAM

#522, 272 Sunhwagung-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do,
12106, Republic of Korea
+82-2-6225-7988
www.sbodyline.com
dfkbiolab@sbodyline.com